

والدین عزیز ،

داروی متوقف کننده بلوغ که برای فرزند شما تجویز شده است در حال حاضر در بازار دارویی ایران به شکل تزریقی و با نام های زیر در دسترس می باشد :

- آمپول میکرورولین (تولید ایتالیا- ایران) نوع ۳/۷۵ جعبه سفید بنفش - نوع ۱۱/۲۵ جعبه سفید سبز
- آمپول واریوپیتایل (تولید سوییس - ایران) نوع ۳/۷۵ جعبه سفید سبز و ۱۱/۲۵ جعبه سفید بنفش
- آمپول لوپرومر (تولید سوییس - ایران) نوع ۳/۷۵ جعبه سفید نارنجی - نوع ۷/۵ جعبه سفید قرمز
- آمپول دیفرلین (تولید فرانسه) نوع ۳/۷۵ و ۱۱/۲۵ جعبه سفید سبز

آمپول لوپرومر و واریوپیتایل باید در یخچال نگهداری شده و فقط قبل از تزریق از یخچال خارج شده و به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در دمای اتاق نگهداری شود.

آمپول میکرورولین و دیفرلین در دمای اتاق (کمتر از ۲۵ درجه) نگهداری می شوند و نیاز به یخچال نمی باشد.

تزریق دارو باید در مراکز درمانی و توسط فرد آموزش دیده انجام شده و قبل از تزریق ، دارو باید به دقت طبق توضیحات بروشور آماده سازی و یکنواخت شود.

جهت کاهش درد میتوان از اسپری لیدوکائین قبل از تزریق استفاده کرد.

آمپول میکرورولین و دیفرلین به صورت عضلانی در عضله باسن ، و آمپول لوپرومر و واریوپیتایل به صورت زیرجلدی (ترجیحا با زاویه ۴۵ یا ۹۰ درجه) در پشت بازو تزریق می شوند.

طبق توصیه پزشک معالج ، دارو هر ۲۸ روز یکبار یا هر ۸۴ روز یکبار (یا هر ۳ ماه) تزریق می شود.

رعایت نظم در زمان تزریق اهمیت زیادی دارد. روز تزریق را حساب نکنید و از فردای آن به مدت ۲۸ یا ۸۴ روز شمارش کرده و روز تزریق بعدی را در تقویم علامت بزنید.

تزریقات را در موعد مقرر انجام دهید. بی نظمی در انجام تزریقات در نتیجه درمان اثر معکوس خواهد داشت و به جای توقف بلوغ ، پیشرفت بلوغ را تحریک خواهد کرد.

یک تا دو هفته قبل از موعد تزریق نسبت به داشتن دارو یا نسخه جدید اطمینان حاصل کنید تا به علت نداشتن دارو روند درمان بی نظم نشود.

به دنبال اولین نوبت تزریق دارو یا طی یک تا دو ماه اول ، احتمال لکه بینی یا خونریزی مشابه قاعدگی وجود دارد که به علت اثر اولیه دارو می باشد و رفع خواهد شد ، بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

عوارض جانبی احتمالی دارو بیشتر مربوط به محل تزریق بوده و ممکن است به صورت درد ، کبودی ، قرمزی یا تورم بعد از تزریق بروز کند که موقتی بوده و به تکنیک و مهارت فرد تزریق کننده بستگی دارد.

عوارض احتمالی دیگر که بسیار نادر هستند ، واکنش حساسیت به دارو، سردرد یا تاری دید هستند.

این دارو عارضه ای در روند بلوغ طبیعی ، باروری و عملکرد جنسی در آینده ایجاد نمی کند. همچنین باعث اضافه وزن ، تخمدان کیستیک یا پوکی استخوان نمی شود با اینحال توصیه می شود کلسیم به اندازه نیاز روزانه از طریق مصرف کافی لبنیات (یا در صورت صلاحدید پزشک استفاده از مکمل) تامین شود.

چنانچه فرزند شما داروهایی مانند رسپریدون ، لیتیوم ، ایمی پرامین ، سیتالوپرام ، اریترومايسين ، کلاریترومایسین ، سیپروفلوکساسین، هیدروکسی زین و ... مصرف می کند و همزمان سابقه بیماری قلبی در کودک یا خانواده وجود دارد قبل از شروع دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

مدت زمان مصرف دارو ممکن است از چندماه تا چند سال بسته به هدف درمان متفاوت باشد.

طی درمان لازم است فرزند شما هر ۳ تا ۴ ماه یکبار توسط پزشک ویزیت شود و در صورت عدم کنترل مناسب بلوغ ممکن است فواصل تزریق دارو کاهش یابد.

هر زمان که طبق نظر پزشک دارو قطع شود مجددا روند طبیعی بلوغ طی ۱۲ تا ۱۸ ماه بازمیگردد.