



 **Lanissa**<sup>®</sup> 2.5 & 5 & 7.5 & 10 mg  
Tirzepatide

**CHANGE BECOMES A LIFESTYLE**

**ZISTDARU**

Unit 404, Official 4th Floor, North Tower-Rosemall Complex, West Hemmat Highway, Tehran, Iran  
[www.zistdaru.com](http://www.zistdaru.com) [info@zistdaru.com](mailto:info@zistdaru.com) [info@zistdaru.com](mailto:info@zistdaru.com)  
Postal Code: 1498711712 **Tel: +982148241000**

### موارد منع مصرف:

- سابقه شخصی یا خانوادگی سرطان مدولاری تیروئید یا سندرم MEN2
- حساسیت شناخته شده به تیرزپاتاید یا سایر ترکیبات لانیسا<sup>®</sup>

### موارد احتیاط:

- احتمال پانکراتیت: در صورت شک به پانکراتیت، مصرف دارو قطع شود.
- عوارض گوارشی (تهوع، استفراغ، اسهال) ممکن است باعث کم‌آبی و اختلال عملکرد کلیه شود.
- در صورت استفاده همزمان با انسولین یا داروهای محرک انسولین، خطر هیپوگلیسمی افزایش می‌یابد.
- دارو را با محصولات دیگر حاوی تیرزپاتاید یا سایر آگونیست‌های GLP-1 همزمان مصرف نکنید.

### عوارض شایع:

- تهوع، استفراغ، اسهال، کاهش اشتها، بیوست، سوء هاضمه، درد شکمی

### شرایط نگهداری:

- در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

لانیسا<sup>®</sup> حاوی ماده فعال تیرزپاتاید است. این دارو یک آگونیست دوگانه گیرنده‌های GIP و GLP-1 می‌باشد که با افزایش ترشح انسولین وابسته به گلوکز، کاهش ترشح گلوکاگون، کند کردن تخلیه معده و کاهش اشتها، باعث بهبود کنترل قند خون و کاهش وزن می‌شود.

### موارد مصرف:

- دیابت نوع ۲: همراه با رژیم غذایی و ورزش برای بهبود کنترل قند خون در بزرگسالان
- کاهش وزن: برای افراد با  $BMI \geq 30$  یا افراد با  $BMI \geq 27$  و حداقل یک بیماری مرتبط با وزن
- آپنه انسدادی خواب: در درمان آپنه انسدادی خواب متوسط تا شدید در بیماران چاق

### دوز و نحوه مصرف:

- دوز شروع دارو: ۲/۵ میلی‌گرم به صورت زیرجلدی، یک بار در هفته به مدت ۴ هفته می‌باشد.
- پس از ۴ هفته: دوز دارو به ۵ میلی‌گرم یک بار در هفته افزایش یابد.
- در صورت نیاز به افزایش بیشتر دوز دارو، دوز به میزان ۲/۵ میلی‌گرم افزایش داده شود. بین هر افزایش دوز باید حداقل ۴ هفته فاصله باشد. حداکثر دوز دارو ۱۵ میلی‌گرم هفتگی می‌باشد.
- تزریق در شکم، ران یا بازو انجام شود؛ محل تزریق هر بار باید تغییر داده شود؛ می‌توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف شود.